

INFORMARE



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Iodură de potasiu 65mg

TERMENUL DE VALABILITATE: 3 ani

INFORMAȚII IMPORTANTE

Comprimatele de iodură de potasiu se administrează **NUMAI** în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunțul autorităților.

Păstrați pastilele de iodură de potasiu într-un loc sigur, uscat și răcoros, la întuneric.

Țineți minte unde depozitați pastilele de iodură de potasiu! Nu le lăsați la îndemâna copiilor!

CARE SUNT DOZELE RECOMANDATE?

Se administrează în doză unică după cum urmează:



Copii nou-născuți - 1 lună:
un sfert de comprimat,
dizolvat în apă sau ceai.



Copii 1 lună - 3 ani:
o jumătate de comprimat,
dizolvat în apă sau ceai.



Copii 3 - 12 ani:
1 comprimat.






Copiii peste 12 ani și adulți:
2 comprimate.



Adulți peste 40 ani:
nu se recomandă profilaxia
cu iodură de potasiu.

CONTRAINDICAȚII

Trebuie avute în vedere următoarele afecțiuni:

-  hipersensibilitate la iodură de potasiu
-  dermatită herpetiformă
-  vasculită cu valori mici ale complementului (afecțiuni autoimune foarte rare).

 **Pacienții cu tiroidectomie au contraindicație la iodură de potasiu.**

Nu există contraindicații pentru gravide și pentru femeile care alăptează.

REAȚII ADVERSE

- Reacții de hipersensibilitate, cum sunt erupții cutanate tranzitorii, edemul glandelor salivare, cefalee, bronhospasm, tulburări gastro-intestinale; acestea pot fi ușoare sau severe ca intensitate și pot fi dependente de doză.
- Au fost raportate hipertiroidism, boli autoimune (Graves și Hashimoto), gușă nodulară toxică și hipotiroidism indus de iod.
- De asemenea, s-au raportat hiperactivitate tiroidiană, tiroidită, mărirea glandei tiroide cu sau fără dezvoltarea mixedemului.
- Administrarea continuă poate determina depresie, nervozitate, impotență sexuală și insomnie.